

PANASZ- ÉS TÜNETMENTES LAKOSSÁG SZÁMÁRA 14 ÉVES KORTÓL AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK								
51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján								
AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLAT		VIZSGÁLAT ELEMELI	érintett korcsoport / vizsgálat gyakorisága					MEGJEGYZÉS
			14-18 év	21 év	21-40 év	40-64 év	65 év felett	
SPECIÁLIS GYERMEKKORI SZŰRŐVIZSGÁLATOK		testi fejlettség, nemi érés, mozgásszervek, golyva, tanulás, hangulati élet vizsgálata	2 évente	iskolaorvos, gyermek- vagy felnőtt családorvos is végezheti				
SZÍV-ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT FELMÉRÉSE		anamnézis felvétele, szervi szövődmények, társbetegségek	2 évente	F E L N Ő T T A L A P S T Á T U S Z	kis szív-érrendszeri kockázat esetén 5 évente		2 évente	ezen vizsgálatok elvégzése minden praxisba újonnan bejelentkező páciens számára előírt
	CSALÁDI ANAMNÉZIS	hypertonia, ISZB, AMI, stroke, daganat, érbetegség, egyéb	2 évente		közepes és nagy szív-érrendszeri kockázat esetén 2 évente			
	ÉLETMÓDBELI RIZIKÓ	alkohol, dohányzás, táplálkozás, testmozgás, fogamzásgátló	2 évente					
	FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT	RR, TT, TM, BMI, (mellkaskörf.) (szsz. EKG, LABOR)	2 évente					
	METABOLIKUS BETEGSÉG	haskőrfogat, TG, HDLC (TC, LDLC), ÉVC, (ppVC, OGTT)	2 évente					
	ATEROSCLEROSIS VIZSGÁLATA		erek tapintása, hallgatózás, ér-Doppler, boka-kar index (ABI)		-	-	nagy szív-érrend. kockázat esetén 2 évente	
VESEKÁROSODÁS VIZSGÁLATA		seKreatinin, Kreatinin-clearance, GFR, vizeletvizsgálat	-		nagy kockázatú személyeknél 2 évente			
ÉRZÉKSZERVEK VIZSGÁLATA		látás-, színlátás-, hallásvizsgálat, sügött beszéd megértése	2 évente		-		évente	
AJAK- ÉS SZÁJÜREGI DAGANATOK SZŰRÉSE		ajak- és szájüregi szervek áttekintése	-	2 évente				
TÜDŐDAGANAT, TBC ÉS COPD* SZŰRÉSE		ernyőképszűrés (40 év felett + dohányzás=kérdőív+spirometria)*	-	2 évente	2 évente	évente*	évente*	rizikócsoporthoz korábban is indokolt
GYOMOR-BÉLRENDSZERI DAGANATOK SZŰRÉSE		széklet rejtett vérzés vizsgálata	-	-	-	50-70 év között évente		rizikócsoporthoz korábban is indokolt
PROSZTATARÁK SZŰRÉSE		urológiai tapintásos vizsgálat, vérvétel (PSA)	-	-	-	50-70 év között évente		rizikócsoporthoz korábban is indokolt
EMLŐRÁK SZŰRÉSE		emlő önvizsgálata oktatása	minden orvos-páciens találkozás alkalmával					*mensest követő 7-10 napon ajánlott
		emlő tapintásos vizsgálata	minden egészségügyi kockázat felmérés alkalmával*					
		MAMMOGÁFIA (emlő-lágyrész rtg vizsgálata)	-	-	-	45-65 év között 2 évente		rizikócsoporthoz korábban is indokolt
MÉHNYAKRÁK SZŰRÉSE		nőgyógyászati vizsgálat, cytologia, kolposzkópia	-	-	25-65 év között 3 évente		rizikócsoporthoz korábban és gyakrabban is indokolt	
CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA		DEXA (csontsűrűség-vizsgálata), labor (vizelet, vér)	-	-	-	50 év felett, ill. menopausa		rizikócsoporthoz férfiaknál is indokolt